

Universi në xhepin tim



Vrimat e Zeza




Frédéric Vincent
Observatori i Parisit

Credit: I.
Sagdejev



Shtypja kolosale në qendrën e një ylli shtyn për nga jashtë, ashtu si avulli në një enë me ujë që vlon.

Graviteti kërkon t'i detyrojë shtresat e jashtme të yllit të bien drejt qendrës, ashtu si molla bie nga pema prej tërheqjes së Tokës.



Një yll është në ekuilibër mes veprimit për nga jashtë të shtypjes termike dhe veprimit për nga brenda të gravitetit.

Ekuilibri i një ylli


Një yll është gjendje ekuilibri mes dy faktorësh të kundërt.

Reaksionet bërthamore në qendrën e yllit (bashkimi i bërthamave të hidroqjenit për të formuar helium, i bërthamave të heliumit për të formuar karbon etj. shih TUIMP 14) e nxehin lëndën dhe shkaktojnë shtypje të fortë, që priret të zgjerojë yllin (ashtu si avulli i yjit nën kapakun e enës).

Graviteti bën që pjesët e jashtme të yllit të tërhiqen drejt qendrës dhe ylli të tkurret.

Këto dy prirje janë në ekuilibër të plotë gjatë kohës më të madhe të jetës së yllit. Po çfarë ndodh kur lënda që prodhon nxehësi, që po e quajmë lënda djegëse, mbaron?

Gravitet




Në mungesë të lëndës djegëse bërthamore, graviteti e detyron yllin të tkurret, dhe kështu krijohet ngjeshje shumë e fortë e lëndës yjore. Mekanika kuantike ka zbuluar **një formë të re bashkëveprimi në këto kushte, të njojur si degjenerim**, që rritet me rritjen e ngjeshjes. Pra, një kundërshtar i ri i del përballë gravitetit, pasi shtypja termike nuk është më e mjaftueshme ta mbajë yllin në ekuilibër. Megjithatë, nëse ylli është mjaft i madh, graviteti mund të fitojë dhe tkurrja të vazhdojë derisa të formohet një vrimë e zezë.

Fundi i jetës së një ylli masiv

Kur e gjithë lënda djegëse në qendrën e yllit është konsumuar, ekuilibri shtypje-gravitet prishet. Graviteti mbizotëron, dhe shtypja nuk është më aq e madhe sa të përballojë peshën e yllit. Ylli fillon të tkurret, të shembet nën peshën e vet.

Kur ylli është i madh (mbi 10 masa diellore) ai vazhdon të ngjeshet në qendër, derisa një formë ekzotike shtypjeje, e quajtur 'shtypja e degjenerimit të neutroneve' të shfaqet dhe ta ndalë tkurrjen. Ndodh edhe që ylli të shpërthejë si supernovë, duke hedhur jashtë shtresat e jashtme të tij. Nëse ajo çfarë mbetet në qendër përmban lëndë sa afro dy masa diellore, kemi një yll neutronik. Nëse masa është më e madhe, as degjenerimi i neutroneve nuk prodhon shtypje të mjaftueshme kundër gravitetit dhe ylli ngjeshet në një vrimë të zezë.

Koha



Kjo diagramë paraqet diametrin e yllit që tkurret (pjesa e kuqe e diagramës, që zvogëlohet me kohën nga poshtë-sipër).


Në njëfarë stadi të kolapsit, shfaqet horizonti i ngjarjeve, dhe rritet drejt diametrit të tij final (pjesa blu e diagramës). Drita e emetuar jashtë horizontit mund të largohet (trajektorja e gjelbër e plotë), por drita e emetuar brenda horizontit (trajektorja e gjelbër vizë-vizë) zihet në kurth. Vrima e zezë është pjesa blu e diagramës.

Formimi i një vrime të zezë


Imagjino një foton(një grimcë drite) të emetuar nga qendra e një ylli që shembet. Fillmisht ky foton mund të dalë nga ylli.

Megjithatë, në një stad më të vonë, ndonëse fotoni fillon të largohet, ai shpejt do të detyrohet të kthehet mbrapsht drejt qendrës së yllit. Pse? Sepse ka lindur një strukturë e re e hapësirë-kohës, e quajtur horizonti i ngjarjeve. Ajo sinjalizon krijimin e vrimës së zezë. Drita e emetuar brenda horizontit të ngjarjeve i nënshtronhet një graviteti aq të madh, saqë mbetet në kurth, brenda horizontit. Një vrimë e zezë është ‘e zezë’ në kuptimin se drita nuk mund të shpëtojë prej saj.

Credit:
ESA



Prania e objekteve masive shtrembüron hapësirë-kohën në afërsi të tyre. Nëse këto objekte janë statike, ky deformim nuk do të përhapet.



Nëse këto objekte janë vrima të zeza në rrotullim rreth njëratjetrës, deformimi përhapet si rrudhat në sipërfaqen e një pellgu, kur hedhim një gur, veçse me shpejtësinë e dritës.

Këto janë valët gravitacionale. Figura më sipër tregon emetimin e këtyre valëve nga një dyshe vrimash të zeza në rrotullim rreth njëratjetrës.

Valët gravitacionale

Vrimat e zeza mund të ekzistojnë edhe në dyshe: secila prej tyre rrotullohet në orbitë rreth tjetrës dhe emetojnë valë gravitacionale.

Imagjinoni një shtresë reçeli me një luleshtrydhe sipër: ajo e deformon paksa sipërfaqen e reçelit.

Një luleshtrydhe tjetër aty pranë do të krijojë deformimin e saj. Nëse i rrotulloni luleshtrydhet rreth njëratjetrës, vijat e deformimit de të shpërndahen në shtresën e reçelit.


Po kështu, valët gravitacionale janë rruhat e deformimit në hapësirë-kohë të shkaktuar nga vrimat e zeza në lëvizje.

Këto rruudha u detektuan për herë të parë në 2016. Ato janë një mënyrë e çmuar për të qjetur vetitë e vrimave të zeza. Çmimi Nobel në Fizikë në vitin 2017 iu akordua këtij detektimi.




Disku i rritjes: Lënda sillet rrotull një vrime të zezë dhe emeton dritë.

ESO / L. Calçada



Shikim artistik i orbitës së një ylli rrotull një vrime të zezë. Zhvendosja graduale e orbitës është shkaktuar nga graviteti jashtëzakonisht i fortë i vrimës së zezë.

Ndonëse një vrimë e zezë është e zezë, nuk mund të thuhet e njëjtë gjë për lëndën rrotull saj. Një vrimë e zezë nuk është një fshesë kozmike me vakum: lënda sillet në orbitë rrreth saj dhe krijon një disk, që quhet disku i rritjes. Këto disqe emetojnë rrezatim të bollshëm në të gjitha gjatësitë valore. Ky rrezatim tregon praninë e vrimës së zezë. Për më tepër, yjet mund të sillen në orbitë rrotull vrimës së zezë, dhe trajektoret e tyre tregojnë praninë e objektit kompakt. Ashtu si valët gravitacionale, drita e emetuar në afërsi të një vrime të zezë dhe yjet fqinjë të saj janë burime të dobishme informacioni për studimin e vetive të vrimave të zeza.



Mars – Maj –
Korrik 2021

Lëvizja e katër
yjeve pranë
vrimës së zezë
supermasive
SgrA* në
qendër të
Rrugës së
Qumështit.
Pika e bardhë
në qendër i
korrespondon
rrezatimit që

del nga disku i rritjes rrotull SgrA*.

Bashkëpunimi EHT
2019



Imazh i zonës më qendrore të diskut të
rritjes që rrethon vrimën e zezë
supermassive në qendrën e galaksisë M87



Vrimat e zeza supermasive

Përpos vrimave të zeza të krijuara nga shembja e yjeve të mëdha, në qendrat e galaksive ka vrima të zeza 'supermasive'.


Çmimi Nobel në vitin 2020 i është akorduar studimit të orbitave të yjeve afër zonës qendrore të Rrugës sonë të Qumështit, të cilat zbuluan ekzistencën e një mase 4 milionë herë më të madhe se Dielli, të ngjeshur brenda një zone jo më të gjërë se Sistemi Diellor.

Vrojtimet e mëvonshme të galaksisë Messier 87 në vitin 2019 çuan në imazhin e parë të zonës afër një vrime tjetër supermasive, dhe i dhanë mbështetje të fortë ekzistencës së këtyre objekteve me masë kaq të madhe.

QUIZ



Cili nga këto imazhe është rezultat i një vrojtimi?



Përgjigjet mbrapa

Simulimi i diskut të rritjes rrotull një vrime të zezë (Owen & Blondin, 2005).

Imazh i vrojtuar i diskut të rritjes në qendrën e galaksisë M87
(Bashkëpunimi EHT 2019).

Simulim i sfondit qiellor të Rrugës së Qumështit me një vrimë të zezë në front
(Riazuelo 2009).

Përajigje

Simulimi i një diskurritjeje rrotull një vrime të zezë në qendrën e galaksisë M87
(Vincent et al. 2019).

Simulimi i një diskurritjeje rrotull një vrime krimbi (wormhole) në qendrën e Rrugës së Qumështit
(Lamy et al. 2018).

Universi në xhepin tim № 17

Ky minilibër është shkruar në vitin 2022 nga Frédéric Vincent i Observatorit të Parisit (France) dhe është riparë nga Eric Gourgoulhon, po kështu i Observatorit të Parisit dhe nga Stan Kurtz (UNAM, Mexico).

Imazhi i kapakut: simulim nga Alain Riazuelo (Instituti i Astrofizikës i Parisit) i sfondit të Rrugës së Qumështit me një vrimë të zezë në front.



Përtë mësuarmë shumë rreth këtij koleksioni dhe temave të paraqitura në minilibra mund të viziton <http://www.tuimp.org>

